Das Risiko in der Anästhesie - Atemwegssicherung
5.12.2015, Dresden

Michael Müller
Klinik f. Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin
St. Josefskrankenhaus, Freiburg

Unser Versprechen: Sicherheit

	All patients (n=46 539)	Died in hospital (n=1864)	Survived to hospital discharge (n=44 657)	Odds ratio (95% CI)	p value
Age (years)	56.7 (18.5)	61.0 (18.7)	56.6 (18.5)	1.01 (1.01-1.02)	<0.0001
Men	22 607	968	21 629	1.15 (1.05-1.26)	0.003
Present smoker	9 872	363	9 503	0.90 (0.80-1.01)	0.07
ASA score					
1	11 642	362	11 280	3.1 % Reference	-
2	21 582	633	20 944	2.9 % 0.94 (0.83-1.07)	0.36
3	11 574	539	11 025	4.6 % 1.51 (1.32-1.73)	<0.0001
4	1 559	279	1 277	17.9 % 6.75 (5.71-7.97)	<0.0001
5	90	49	41	54.4 % 35.61 (23.23-54.59)	<0.0001

Anästhesiebedingte Todesfälle
Closed Claims Project: Review von Haftpflichtverfahren in der Anästhesie

- 1990 – 1994: 31% der Verfahren wegen Tod oder permanentem Hirnschaden
- Unter 1411 Fällen mit Todesfolge oder permanentem Hirnschaden:
 - 111x inadäquate Ventilation
 - 68x Medikationsfehler
 - 66x unerkannte oesophageale Intubation
 - 58x verfrühte Extubation

Cheney FW Anesthesiology 2006; 105:1081

Entwicklung in der Anästhesie

- Pulsoximetrie
- Kapnographie
- Fiberoptik
- Supraglottische Atemwegshilfen
- Videolaryngoskope

Vorhersage des schwierigen Atemwegs

- Mallampati – Score/ Samssoon & Young
- Thyromentaler Abstand
- Upper Lip Bite Test
- Beweglichkeit der HWS
- Test nach Vaughan: Mundöffnung
- Palm Print Test
- Wilson Risk Score
- Amé – Score

Prädiktoren für den schwierigen Atemweg

Schwierige Intubation in der Anamnese
Stridor
Tumoren, Abszesse im Kopf-Hals- oder Mediastinalbereich
Z.n. Bestrahlung im Kopf-Halsbereich
Z.n. Operationen am Larynx/Pharynx
Progenie, Dysgnathie
Raumfordernde Struma
Makroglossie z.B. bei Patienten mit Mucopolysaccharidose oder Trisomie 21

Prädiktoren für den schwierigen Atemweg

mandibulo- und maxillofaciale Dysostosen
Eingeschränkte Mundöffnung
Eingeschränkte Reklination des Kopfes
Verringerter thyromentaler Abstand
Kurzer oder umfangreicher Hals
subglottische Stenose, Trachealstenose, Trachealverlagerung
Schlafapnoe-Syndrom
Schwangerschaft
Mallampati Grad III oder IV

Handwritten medical form titled "ANDDK" with patient information and a detailed checklist. The form includes fields for patient name, date of birth, and medical history. It contains a large table with various checkboxes for clinical observations and procedures. Handwritten notes in German are present at the bottom of the form, including "Billi 1MC - Postop" and "Björn Loh".

Tab. 96.2 Multifaktorieller Risiko-Index nach Apfel [1]

Risikofaktor	Punkt-wert
Schwierige Intubation in der Anamnese	nein 0 ja 10
Pathologien assoziiert mit einem schwierigem Atemweg (z. B. vorstehende Zähne, fliehendes Kinn, Tumore, etc.)	nein 0 ja 5
Klinische Zeichen eines pathologischen Atemwegs (z. B. Stridor, Schluck- und Sprachstörungen, OSAS, etc.)	nein 0 ja 3
Mundöffnung (Abstand Schneidezähne (SZ) und Unterkieferkante (UKL))	SZ > 5 cm oder UKL > 0 0 SZ 3,5-5 cm und UKL < 0 3 SZ < 3,5 cm und UKL < 0 13
Thyromentaler Abstand (Pati)	≥ 6,5 cm 0 < 6,5 cm 4
Kopf-Hals-Beweglichkeit (Reklination)	> 100° 0 90° ± 10° 2 < 80° 5
Modifizierter Mallampati-Score	Grad 1 0 Grad 2 2 Grad 3 6 Grad 4 8

Handwritten note: Apfel Score 10 + 5 + 3 = 18 (29)
 Schwierige Intubation ja

- ### Prozess-/ Systemkenntnis
1. Narkoseeinleitung, unerwartet schwieriger Atemweg (Maskenbeatmung schwierig, Intubation nicht möglich)
 2. Intubationslarynxmaske einführen
 3. Blocken
 4. Beatmung -> Oxygenierung
 5. Tubus über LaMa einführen
 6. Blocken
 7. Konnektieren, beatmen
 8. Larynxmaske entfernen
-

- ### CRM: Entscheidungsfindung
- Hoher Zeitdruck: verkürzte Entscheidungsfindung – 10 Sekunden für 10 Minuten
 - "Schnellschüsse" vermeiden
 - 3 Alternativen, beste auswählen
 - FORDEC

- ### CRM: Entscheidungsfindung
- 66 jähriger Mann, V.a. Larynx-Ca.
 - Z.n. Apoplex, Hemiparese li.
 - Dyspnoe, Pneumonie, SpO₂ im Sitzen 89% (RL)
 - Endoskopie: Glottis nur teilweise einsehbar
-

Transtracheale Oxygenierung

active expiration

ventrolink

passive expiration

32

Training unter Stress

33

Atemwegssicherung bei der Reanimation

- Airway-Management ist abhängig von **Patientenfaktoren** und von den **Fertigkeiten** des Helfers
- Endotracheale Intubation: **Optimale Methode** zur Erhaltung und Sicherstellung des Atemwegs
- Intubation nur durch in der Methode **erfahrene Anwender**
- Laryngoskopie während laufender Thoraxkompressionen; **Unterbrechung** zur Passage der Glottis **max. 5 Sek.**
- Zur Überprüfung der Tubuslage und Überwachung der Reanimationsqualität: **Kapnographie!**

34

Zusammenfassung

- Risikoevaluation vor jeder Anästhesie
- Bei erwartet schwierigem Atemweg -> Kein Risiko!
- Bei unerwartet schwierigem Atemweg:
 - Standard für Vorgehen
 - Poster mit (lokalem) Algorithmus
 - Keine Panik; 10 Sek überlegen, risikoärmstes Verfahren
- Prävention durch Training
 - Systemkenntnis
 - Training unter Zeitdruck und Stress
 - Problemlösestrategien

35

RKK KLINIKUM

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

michael.mueller@rkk-klinikum.de

36