

Differentialdiagnosen exanthemischer Hautkrankheiten

	DD exanthemischer Infektionskrankheiten				
	Masern	Röteln	Exanthema subitum (Dreitagefieber)	Erythema infectiosum (Ringröteln)	Scharlach
Erreger	Masernvirus (Paramyxov.)	Rötelnvirus (Togav.)	Herpesvirus Typ 6	Parvovirus B19	beta-hämolys. lysogene Streptok. Gruppe A
Kontagiosität	hoch	wenig	gering	gering	
Inkubationszeit	11 Tage	2 - 3 Wochen	10 - 14 Tage	6 - 14 Tage	2-5 Tage
Klinik	Allgemeinsymptomatik + katharral. Prodromalstadium	nicht selten inapparent (+ Lymphadenopathie)	keine Prodromi; bei Exanthemausbruch Leukopenie mit absoluter Lymphozytose		schwere Allgemeinsymptomatik
Prodromalstadium	3 - 5 Tage	1 - 2 Tage	3 - 4 Tage		0 Tage
Fieber	hoch, 2gipflig	mäßig	3 Tage; Abfall bei Exanthemausbruch!!!		plötzlich hoch
Rachenbefund	Kopliksche Flecken (2. od. 3. Tag): kalkspritzerart. nicht wegwischbare Flecken mit rotem Randsaum; ab 3. Tag: Enanthen an Gaumen & Rachen	diskretes Enanthen	kein	kein	fleckig, düsterrotes Enanthen am Gaumen & belegte Zunge; dann Himbeerzunge
Exanthemform	(makulös) großfleckig -konfluierend; intensiv rot; für 8 Tage	kleinfleckig blaßrot (makulo - papulös), von anäm. Hof umgeben	blaßrote, klein - mittel-fleckig (makulopapulös)	makulöpapulöses Exanthen; girlandenförm. Aussehen	feinfleckig (kleinpapulös) folliculär (reibeisenartig); periorale Blässe
Ausbreitung	von retroaurikulär über Stirn, Hals, Stamm & Extremitäten incl. Handflächen & Fußsohlen	beginnt im Gesicht (schmetterlingsförmig); Ausbreitung nach retroaurikulär, dann über Stamm & Extremitäten; Dauer: 2-3 Tage	Stamm & Extremitäten; im Gesicht kaum sichtbar; Dauer: Stunden bis Tage	schmetterlingsförm. Wangenerythem; Ausbreitung von den Extremitäten auf den Stamm	innerhalb v. 2 Tagen: vom Hals über Stamm auf Extremitäten
Komplikationen/ Begleitsymptome	Konjunktivitis, Rhinitis, Otitis media, Pneumonie	Embryopathie, Mikrozephalus	selten initialer Krampfanfall		Nephritis, Myokarditis, Lymphadenitis