

Nachsorgeplan Malignes Melanom (MM)

			Klinische Untersuchung	Labor (S100, LDH)	Sonographie (Narbe, Transit, regionäre Lymphknoten)	Schnittbildgebung (CT Hals-Thorax-Abdomen-Becken + CCT, ggf. MRT; ggf. PET-CT/-MRT)
Stadium IA	Jahr 1-3	Hautarzt <i>bei Ulzeration:</i> UHTC	alle 6 Monate	--	--	--
	Jahr 4-5		alle 12 Monate	--	--	--
	Jahr 6-10		alle 12 Monate	--	--	--
Stadium IB – IIB**	Jahr 1-3	Hautarzt und UHTC im Wechsel*	alle 3 Monate		alle 6 Monate	--
	Jahr 4-5		alle 6 Monate		nur bei schlechter klinischer Beurteilbarkeit	--
	Jahr 6-10	Hautarzt	alle 6-12 Monate		--	--
Stadium IIC-IV	Jahr 1		alle 3 Monate			alle 3 Monate
	Jahr 2					alle 3 Monate
	Jahr 3					alle 3 bis 6 Monate
	Jahr 4-5	Hautarzt und UHTC im Wechsel*	alle 3 Monate		alle 6 Monate	individuell, bei ausgeprägter initialer Tumorlast ggf. alle 3-6 Monate
	Jahr 6-10	Hautarzt und UHTC im Wechsel	alle 6 Monate	alle 6 bis 12 Monate	--	--

* Termin im Hauttumorzentrum (Universitäts HauttumorCentrum UHTC) jeweils mit Sonographie. Wenn Sono über Hautarzt abgesichert ist, dann Nachsorge auch komplett beim Hautarzt.

** Nur bei korrektem pathologischem Staging mittels SLNB. Sonst (ohne SLNB) Nachsorge IB-IIB wie IIC-IV. Bzgl. Indikation für SLNB siehe [Behandlungspfad Melanom Stadium I und II](#)