UROlogisch! 11/2021

Aktuelles zur Nierentransplantation - Zahlen und kurzer Leitfaden ambulanter urologischer Nachsorge nach NTX

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

Dr. med. J. Putz

Klinik und Poliklinik für Urologie
Direktor: Prof. Dr. med. C. Thomas

Ausgangslage ET Raum

Deutschland (Zahlen 2019)

- ca. 83.000.000 EW
- ca. 80.000 Dialysepatienten
- ca. 7.200 auf WL zur NTX (knapp 10%)

3.000 Neuaufnahmen auf Warteliste/Jahr
2.100 NTX/2019

→ Diskrepanz (Organmangel)

Quelle: www.eurotransplant.org

Entwicklung Transplantationszahlen Deutschland

Entwicklung der Organspende deutschlandweit

11-11,2 Spender/Mio EW

Nierentransplantationen deutschlandweit gesamt

Quelle: DSO

Organspender der verschiedenen Regionen

Quelle: DSO

Organspender der verschiedenen Regionen

Quelle: DSO

Nierentransplantationen deutschlandweit 2019

Quelle: DSO

Transplantationsdaten am Zentrum Dresden

Zentrum Dresden – 26 Jahre Nierentransplantation (NTX)

fast 1200 NTX insgesamt

→ davon über **220 Lebendnierenspenden**

2020: 22 Organspenden am UKD

→ Höchstwert aller Entnahmekliniken deutschlandweit

engmaschige Nachsorge der Patienten am Zentrum
von Nephrologie und Urologie

allein 2020 über 400 urologische Konsultationen

TX-Zahlen Zentrum Dresden – postmortale NTX

pandemiebedingter Rückgang der Transplantationen 2020

TX-Zahlen Zentrum Dresden – Lebendnierenspende

Zentrum Dresden - Wartelistenentwicklung

Zentrum Dresden – Wartezeiten auf ein Organ 2020

- ca. 36% der Patienten warten länger als 7 Jahre auf eine Niere
- die durchschnittliche Wartezeit auf ein Organ in der regulären Allokation betrug 2020 im Schnitt 7,8 Jahre
- im Seniorprogramm („old-for-old“ mit Spendern über 65 Jahre für Empfänger über 65 Jahre) im Schnitt 3,8 Jahre
- 80% der Wartenden am Zentrum Dresden sind unter 65 Jahre alt
- Problematik der regelmäßigen Kontrollen in der Wartezeit - Erhöhung Komorbidität etc.

Covid-19 Pandemie und NTX am UKD

Pausierung der Lebendnierenspenden 03/20-05/2020 sowie 11/20-04/2021

Rücksprachen postmortale Empfänger im Falle Organangebot
(NTX-Wunsch ja/nein)

bei Aufnahme: Schnelltest und PCR auch nach erfolgter Impfung

Spender per se negativ als Grundvoraussetzung

- interm. Beginn Telefon-Sprechstunden
- Rückstellung Neuaufnahmen auf die Warteliste vor allem ab 09/20
- Forcierung der Impfempfehlungen

Covid-19 Pandemie und NTX

Problematik:

Immunantwort nach NTX unter Immunsuppression deutlich reduzierter als wenn Impfung VOR NTX stattfindet

nach NTX max. 40-50% AK-Bildung nach 2. Impfung

→ dringende Empfehlung der Impfung der Patienten VOR Aufnahme auf die Warteliste

Humoral and cellular immunity to SARS-CoV-2 vaccination in renal transplant versus dialysis patients: A prospective, multicenter observational study using mRNA-1273 or BNT162b2 mRNA vaccine

Stumpf et al. Lancet Reg Health Eur. 2021

Three doses of an mRNA Covid-19 vaccine in solid-organ transplant recipients

Kamar et al. N Engl J Med 2021

Kurzer Leitfaden ambulanter urologischer Nachsorge bei NTX-Patienten

„Urologische“ Ursachen der terminalen Niereninsuffizienz

morphologisch	funktionell
Nierenagenesie	Blasentleerungsstörung (obstruktiv, neurogen)
Urethrale Fehlbildung	Inkontinenz
Harnröhrenstrikturen	
Refluxnephropathie	
Uretermündungsstenose	
Ureterabgangsenge	
Nierenverlust (traumatisch, iatrogen)	
Steinbildung (Nephrokalzinose, rez. Interventionen)	

- ggf. resultierende chronische Infektsituation mit Minderung oder Verlust des Transplantaterfolges
- Beginn des NTX-Erfolges also noch vor der eigentlichen Operation

Chronischer Nierenfunktionsverlust

Rezidivierende Infekte sind mit chronischem TX-Verlust assoziiert

de Souza et al. Nat Clin Pract Nephrol. 2008

Urinary tract infection in the renal transplant patient

Castaneda et al. Transplant Proc. 2013

Urinary tract infection and Kidney Transplantation: A review...

Schmaldienst et al. Curr Opin Urol. 2002

Urinary tract infections after renal transplantation

Illesy et al. Transplant Proc. 2016

Bacterial Infections After Kidney Transplantation: A Single-Center Experience

Ziele präoperativer urologischer Vorbereitung

Grundprinzipien

„normale“ Miktionsverhältnisse schaffen
Sanierbare Infektursachen suchen
Ausschluss von Tumoren

- Blasenentleerungsstörung ? - ggf. Miktionsstraining VOR NTX
- Subvesikale Obstruktion ? - Sanierung VOR NTX bei ausreichender Restdiurese
- Urolithiasis ? - Sanierung VOR NTX
- Indikation zur Eigen-Nephrektomie ? - rez. Infekte? Platzprobleme ? Tumore ?
- Makrohämaturie ? – umfassende Abklärung VOR Listung

→ urologische Pathologieabklärung gemäss „gewöhnlichen Patienten“!

Nachsorge ist wichtig

– denn darum kümmert sich der Urologe/die Urologin:

- | Wundkontrolle
- | **Infektionen**
- | Tumorvor-/nachsorge
- | **Miktio**n/Inkontinenz
- | Partnerschaft
 - Potenz
 - Fertilität

**Nutzung urologischer
Grundkompetenzen!**

Harnwegsinfektionen

Risiko am höchsten in ersten 3-6 Monaten nach
NTX

Bis zu 3/4 aller Patienten betroffen

Größte Anteil aller Infekte nach NTX

Frauen häufiger betroffen

Parasuraman R. et al. Urinary tract infections in solid organ transplantation. Am J Transplant. 2013; 13 [Suppl 4]:327-336

- genaue Anamnese und Uringewinnung (ggf. mit Katheter! ggf. auch stationär!)
- Sonographie (Restharn?)

Frauen: Miktionstraining; Hygiene; Vorstellung Gynäkologie; ggf. geschützter GV

Männer: Abklärung: Blase, Prostata, Harnröhre

Tumorvor/-nachsorge

Tumornachsorge

- Transplantierte Patienten: durchschnittlich **mind. 4-fach erhöhtes Risiko der Tumorentwicklung** im Vergleich zur Gesamtpopulation

Buell Transplantation 2005

- **urogenitale Tumore = 2. häufigste Krebserkrankung** nach Hauttumoren nach Tx

- etwa **2% aller Nierentransplantierten** entwickeln **urologische de-novo Tumore**

Development of urologic de novo malignancies after renal transplantation. Hevia et al. Transpl Proc 2014

Urological malignancy after renal transplantation. Besarani et al. BJU Int 2007

Tumorerkrankungen nach Transplantation

Buell et al. Malignancy after Transplantation
Transplantation 2005

Tumornachsorge

Prozentualer Anteil der häufigsten Tumorlokalisationen an allen Krebsneuerkrankungen in Deutschland 2012 (ohne nicht-melanotischen Hautkrebs) - Angaben in Prozent; Quelle: RKI

Tumorvor/-nachsorge

- vor Transplantation sehr gutes Screening

- nach Transplantation:

 - was sollte sein ?

 - Nierentumor

 - Blasentumor

 - Prostatatumor

 - Hodentumor

Tumorvor/-nachsorge

Solide Tumore nach NTX - Screening

■ Hodentumor:

- Selbstuntersuchung
- Sonographie

■ Urothelkarzinom:

- Keine generellen Empfehlungen
- Individuell nach Risiko
(Analgetikanephropathie, langjähriger Nikotinabusus)

Urinstatus, ggf. Urinzytologie, Zystoskopie

→ konsequent bei Mikrohämaturie und Z.n. Nikotinabusus!

Tumorvor/-nachsorge

Solide Tumore nach NTX - Screening

■ Nierenzellkarzinom:

- Sonografie der Eigennieren
zusätzlich zum Transplantat mind. jährlich

■ Prostatakarzinom:

- ab 40/45 Jahre: digitale Palpation und
- PSA-Bestimmung einmal jährlich

Risikofaktoren Nierenzellkarzinom

- Alter, Übergewicht (bei Frauen)
- Tabakrauchen (2fach), Alkoholkonsum (bei Frauen)
- regelmässiger Analgetikakonsum, Diuretika
- Hypertonie (2-3fach)

- ↑ Dialysedauer - ↑ Inzidenz von Nierenzysten - ↑ Risiko von Tumoren in diesen Zysten (ca. 6% der Dialysepatienten)

- keine grundsätzliche Risikoerhöhung bei ADPKD

Keith et al. 1994; Marple et al. 1994

→ Risiko bleibt auch nach NTX erhalten (10-20fach erhöhtes Risiko!)

- Immunsuppression

Prostatakarzinom und NTX - Risiko

- Risiko der Tumorübertragung < 0,01%
- Risiko einer P-Ca Entwicklung weder an Dialyse noch nach Tx erhöht

Kasiske et al. USA 2004: Risiko 2fach erhöht - a.e screening bias

Cave PSA:

- Gesamt-PSA gleich, fPSA an Dialyse kann 20-40% erhöht sein
- Kein Einfluss der Immunsuppression auf PSA

Joseph et al. Urology 2010

Prostatakarzinom

Interdisziplinäre Leitlinie der Qualität S3 zur Früherkennung, Diagnose und Therapie der verschiedenen Stadien des P-Ca

- **Konsequente Anwendung der Leitlinie auch/insbesondere bei Dialysepatienten und Patienten nach NTX !**

Prostatakarzinom und NTX - Therapie

- keine Unterschiede im Bezug auf Therapieregime

Hevia et al. Transpl Proc 2014

- heilende Behandlung anstreben

Option in Abhängigkeit Vor-OP`s, Allgemeinzustand etc.

Operation oder Bestrahlung

- Wartezeit nach heilender Therapie 2-5 Jahre in Abh. Rezidivgefahr

Zusammenfassung

- ✓ saubere Anamnese und Diagnostik
- ✓ „normale“ Miktionsverhältnisse schaffen
- ✓ sanierbare Infektursachen suchen
- ✓ Ausschluss von Tumoren

mögliche Probleme vor NTX therapieren/optimieren

- ✓ engmaschige urologische Nachsorge

Kontakt

TX-Sekretariat des UKD

Simone Milde

simone.milde@uniklinikum-dresden.de

Amelie Grund

amelie.grund@uniklinikum-dresden.de

Margrit Reinhardt

margrit.reinhardt@uniklinikum-dresden.de

Direkte Ansprechpartnerin Urologie:

OÄ Putz

juliane.putz@uniklinikum-dresden.de